



Utilizzo DPI misure COVID-19 "Fase 2"

Premessa: La protezione dei collaboratori ha la priorità assoluta. La "Fase 2" presuppone che le varie procedure siano efficaci, che vi sia una conoscenza generale e una consapevolezza della sicurezza tra il personale del servizio di soccorso e la popolazione e che le misure organizzative dovrebbero e possono facilitare il lavoro del personale, soprattutto nella stagione calda.

A questo proposito, il comportamento dei collaboratori e l'uso dei DPI devono essere adattati alla situazione del paziente e al numero dei collaboratori coinvolti nell'operazione.

Premessa: Tutti i pazienti, indipendentemente se trasportati o soccorsi ricevono

- a) una mascherina chirurgica
- b) disinfezione delle mani
- c) guanti
- d) visiera riutilizzabile (se disponibile)

1. Linee guida per l'uso dei DPI nel trasporto infermi o nel servizio di soccorso di pazienti "non positivi COVID" e "casi non sospetti"

1.1 Livello collaboratori con contatto breve con il paziente (ad es. autisti)

- Mascherina FFP-2 per protezione del collaboratore
- Misure di igiene personale (guanti in caso di contatto, disinfezione delle mani prima e dopo il trasporto)

1.2 Livello collaboratori con contatto sociale con il paziente (ad es. permanenza nella stanza con il paziente, misurazione RR, anamnesi senza misure salvavita)

- FFP-2 Maschera per protezione del collaboratore
- Occhiali di sicurezza/visiera (se disponibili)
- Misure di igiene personale (guanti in caso di contatto, disinfezione delle mani prima e dopo il trasporto)

1.3 Collaboratori con contatto esposto con il paziente (ad es. rianimazione, attuazione di misure salvavita direttamente sul paziente, somministrazione di O₂, assistenza medica d'urgenza diretta)

- Maschera FFP-3 per protezione del collaboratore
- Camice /grembiule monouso idrorepellente (in sostituzione Overall)
- Guanti
- Occhiali di sicurezza/visiera (se disponibili)
- Misure di igiene personale (guanti, disinfezione delle mani prima e dopo il trasporto)

NOTA: Il processo di lavoro dovrebbe essere organizzato in modo tale che solo il personale che lavora direttamente sul paziente indossi i DPI potenziati. I collaboratori con DPI standard (possibilmente autisti) possono così lavorare al di fuori dell'ambiente immediato del paziente per attività di comunicazione e di supporto.



2. Linee guida per l'utilizzo dei DPI in casi COVID-positivi e sospetti di COVID sulla base delle indicazioni del "Rapporto ISS COVID-19 n. 2/2020".

Condizioni di lavoro e di funzionamento	Target	Attività	Tipo di DPI o misure di protezione
Ambulanze di trasporto e veicoli di soccorso	Soccorritori	Trasporto di un paziente COVID-19 (sospetto o positivo) in una struttura sanitaria	<ul style="list-style-type: none"> Mascherina FFP2 o FFP3 Camice¹/grembiule monouso idrorepellente Guanti Occhiali di protezione/visiera²
	Autisti di mezzi d'intervento	<u>Solo guida del veicolo con a bordo paziente sospetto o confermato COVID-19 e separazione del vano conducente dal vano paziente (separazione microclimatica³)</u>	<ul style="list-style-type: none"> Mascherina FFP-2
	Autista/soccorritore in fase di ripristino dell'automezzo	Aiuto nel carico e scarico di un paziente COVID-19 o di un caso sospetto	<ul style="list-style-type: none"> Mascherina FFP 2 oder FFP 3 Camice/grembiule monouso idrorepellente Guanti Occhiali di protezione/visiera
		Pulizia dopo il trasporto di pazienti con sospetta infezione da COVID-19 (al termine del trasporto possibilmente ventilare il vano paziente)	<ul style="list-style-type: none"> Mascherina FFP 2 Guanti Occhiali di protezione/visiera

Nota generale sull'uso di veicoli multifunzione: Per il trasporto di pazienti COVID positivi o sospetti di COVID può essere impiegato solamente il conducente di questi automezzi. A questo proposito è sottointeso che in questi veicoli vengono trasportati solo pazienti in grado di deambulare. Sono possibili trasporti multipli di pazienti COVID-positivi. DPI: Stessi requisiti del "Conducente di veicoli di emergenza - assistenza al carico e allo scarico". I dispositivi di protezione ridotti (maschera FFP-2 e occhiali protettivi) possono essere presi in considerazione in caso di dimissione di pazienti dalle strutture di quarantena, se ciò è stato disposto dalla Centrale Operativa dopo consultazione con il Servizio Igiene dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige.

¹ Se non disponibile Overall

² Da utilizzare, se disponibili, con occhiali di protezione

³ Vetro divisorio chiuso tra il vano conducente e il vano paziente e sistemi di condizionamento d'aria funzionanti separatamente